

Bestandteile sind. Diese Stoffe finden Sie unter Abschnitt 6;

- Wenn Sie allergisch gegen Echinacea purpurea oder andere Pflanzen der Asteraceae-Familie (Korbblütler) sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Echinaforcedmed einnehmen.

- Wenn Sie an bestimmten progressiven systemischen Erkrankungen leiden (chronische Erkrankung einiger Organe oder des gesamten Körpers, die immer schwerer wird), Autoimmunerkrankungen (Krankheit, bei der der Körper die körpereigenen Zellen als fremd betrachtet), Immundefekten (ein nicht oder nicht funktionierendes Immunsystem), Immunsuppression (Unterdrückung der natürlichen Abwehrreaktionen gegen körpereigene Substanzen) und Erkrankungen der weißen Blutkörperchen.
- Bei Verschlimmerung der Symptome oder hohem Fieber während der Einnahme von Echinaforcedmed sollte ein Arzt hinzugezogen werden.
- Wenn Sie eine genetische Veranlagung für eine Allergie haben, sollten Sie vor der Einnahme von Echinaforcedmed Ihren Arzt konsultieren.

Kinder
Die Einnahme durch Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Einnahme von Echinaforcedmed zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Es liegen keine Berichte über Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln vor.

Einnahme von Echinaforcedmed zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Echinaforcedmed kann zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken verwendet werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Einnahme während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Echinaforcedmed enthält Sucrose.
Bitte nehmen Sie Echinaforcedmed erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.
Enthält 4,121 g Sucrose pro 5 ml. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

3. Wie ist Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:
Kinder über 12 Jahre, Erwachsene und ältere Menschen:
• Tage 1 bis 3: 5 x täglich 5 ml einnehmen.
Tage 4 bis 10: 3 x täglich 5 ml einnehmen.

Einnahme durch Kinder
Die Einnahme durch Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Nur zum Einnehmen. Nehmen Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis ein.
Vor Gebrauch schütteln.
Echinaforcedmed muss in 150 ml warmem Wasser aufgelöst werden. Vor dem Trinken rühren.

Beginnen Sie die Behandlung bei den ersten Anzeichen.
Wenn die Symptome länger als 10 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge von Echinaforcedmed eingenommen haben, als Sie sollten
Wenn Sie eine größere Menge von Echinaforcedmed haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis eingenommen haben, sind im Allgemeinen keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Wenn Sie die Einnahme von Echinaforcedmed vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, und nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit ein.

Wenn Sie die Einnahme von Echinaforcedmed abbrechen
Es sind keine Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Einnahme dieses Arzneimittels abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die

aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Haut
Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, Nesselsucht, Juckreiz, Anschwellen des Gesichts.
Angioödem der Haut (plötzliche Ansammlung von Flüssigkeit in der Haut und Schleimhäuten (z. B. Hals oder Zunge), Atembeschwerden und/oder Juckreiz und Hautausschlag).

Allergische Reaktionen
Allergische Reaktionen in Höhe der Lunge, Bronchospasmen mit Obstruktion, Asthma. Stevens-Johnson-Syndrom (schwere allergische Reaktion mit hohem Fieber, Blasenbildung auf der Haut, Gelenkschmerzen und/oder Augenentzündung). Anaphylaktischer Schock (schwere allergische Reaktion auf bestimmte Substanzen, bei denen starker Blutdruckabfall, Blässe, Unruhe, schwacher schneller Puls, kalte und feuchte Haut und Bewusstseinsstörung infolge einer plötzlichen, starken Gefäßerweiterung auftreten).

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt melden unter:

Föderale Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
www.afmps.be
Abteilung Vigilanz
Website: www.notifierunefettindesirable.be
E-Mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern . Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).
Nach dem Öffnen der Packung innerhalb eines Monats verwenden.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach <EXP> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.


6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Echinaforcedmed enthält
• Der Wirkstoff ist ein Extrakt aus der Pflanze und Wurzel von Echinacea purpurea (Purpur-Sonnenhut).
• Die sonstigen Bestandteile sind: Saccharose, gereinigtes Wasser, konzentrierter Holunderbeerensaft, Zitronensäure-Monohydrat, modifizierte Stärke, mittelkettige Triglyceride, Kaliumsorbat.

Wie Echinaforcedmed aussieht und Inhalt der Packung
Echinaforcedmed Hot Drink ist eine dunkelrote bis dunkelviolette klebrige Flüssigkeit mit einem aromatischen fruchtigen Holunderduft und einem aromatischen, fruchtigen, süßen, leicht sauren Geschmack.

Dieses Arzneimittel ist in Flaschen zu 100 ml verpackt.

Registrierungsinhaber und Hersteller
Registrierungsinhaber
A. Vogel N.V.
Bosstraat 54 Bus 7
3560 Lummen
Belgien



Tel.: +32 (0) 13 35 89 40
Fax: +32 (0) 13 52 39 41
info@avogel.be

Hersteller
A.Vogel BV
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Niederlande
Tel.: +31 (0) 525 687200
Fax: +31 (0) 525 683932
registratie@avogel.nl

Zulassungsnummer
BE-TU661454

Art der Abgabe
Apothekenpflichtig.

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker in Verbindung.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 03/2024.



Fold

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Echinaforcedmed concentraat voor drank

Echinacea purpurea

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of apotheker u dat heeft verteld.

1. Wat is Echinaforcedmed concentraat voor drank en waarom wordt dit middel gebruikt?

Echinaforcedmed is een traditioneel kruidengeneesmiddel gebruikt voor de verlichting van symptomen van een verkoudheid.

Dit product is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij de gespecificeerde indicatie uitsluitend gebaseerd op langdurig gebruik.

Echinaforcedmed is geïndiceerd voor volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar.

Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder of wordt deze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u Echinaforcedmed concentraat voor drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Echinaforcedmed niet gebruiken?
• U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze



pharma code

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Echinaforcedmed concentraat voor drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Echinaforcedmed concentraat voor drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Echinaforcedmed concentraat voor drank?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Echinaforcedmed concentraat voor drank?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Echinaforcedmed concentraat voor drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Echinaforcedmed is een traditioneel kruidengeneesmiddel gebruikt voor de verlichting van symptomen van een verkoudheid.

Dit product is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij de gespecificeerde indicatie uitsluitend gebaseerd op langdurig gebruik.

Echinaforcedmed is geïndiceerd voor volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar.

Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder of wordt deze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u Echinaforcedmed concentraat voor drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Echinaforcedmed niet gebruiken?
• U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze

stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
• U bent allergisch voor Echinacea purpurea of voor andere planten van de Asteraceae (Composieten) familie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Echinaforcedmed?

- Neem contact op met uw arts, apotheker voordat u Echinaforcedmed gebruikt.
- Indien u lijdt aan bepaalde progressieve systemische aandoeningen (chronische aandoening van een aantal organen of het gehele lichaam die steeds ernstiger wordt), auto-immuunziekten (ziekte waarbij het lichaam de lichaamseigen cellen als lichaamsvreemd aanziet), immunodeficiënties (een niet of niet goed werkend afweersysteem), immunosuppressie (het onderdrukken van de natuurlijke afweerreacties tegen lichaamseigen stoffen) en ziekten van het witte bloedcel systeem.
 - Als de verschijnselen verergeren of hoge koorts treedt op tijdens het gebruik van Echinaforcedmed dient een arts te worden geraadpleegd.
 - Indien u een erfelijke aanleg heeft voor het verkrijgen van een allergie moet u uw arts raadplegen vooraleer u Echinaforcedmed begint te gebruiken.

Kinderen
Het gebruik bij kinderen onder 12 jaar wordt niet aanbevolen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Echinaforcedmed nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen meldingen van wisselwerkingen met andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken
Echinaforcedmed kan in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding wordt niet aanbevolen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Echinaforcedmed bevat sucrose
Indien uw arts u heeft megedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.
Dit geneesmiddel bevat 4,121 g sucrose (saccharose) per 5 ml. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

3. Hoe gebruikt u Echinaforcedmed concentraat voor drank?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
Kinderen ouder dan 12 jaar, volwassenen en ouderen:
• Dag 1 tot 3: 5 keer per dag 5 ml innemen.
Dag 4 tot 10: 3 keer per dag 5 ml innemen.

Gebruik bij kinderen
Het gebruik bij kinderen onder 12 jaar wordt niet aanbevolen.

Enkel voor inname via de mond. Niet meer dan de aanbevolen dosering gebruiken. Schudden voor gebruik.
Echinaforcedmed moet opgelost worden in 150 ml warm water. Roer voor het drinken.

Start de behandeling bij de eerste verschijnselen.
Indien de symptomen langer dan 10 dagen aanhouden, neem contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van Echinaforcedmed gebruikt?
Wanneer u te veel van Echinaforcedmed heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact met uw arts, apotheker of het Antigiftcentrum (070/245.245).

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft gebruikt, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten Echinaforcedmed te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen en neem de volgende dosis op het gewone tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van Echinaforcedmed
Er zijn geen effecten te verwachten als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Huid
Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, netelroos, jeuk, opzwellen van het gelaat.

Angio-oedeem van de huid (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag).

Allergische reacties
Allergische reacties ter hoogte van de longen, bronchospasmen met obstructie, astma.
Stevens-Johnson-syndroom (ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking)
Anafylactische shock (ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge, sterke vaatverwijding)

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
www.fagg.be
Afdeling Vigilantie
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
E-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Echinaforcedmed concentraat voor drank?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden de 25 °C.
Na opening in de koelkast bewaren (2 °C - 8 °C).

93001150 77000784 / AV20240409

Gebruiken binnen de maand na
openen van de verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer
na de uiterste houdbaarheidsdatum.
Die is te vinden op de verpakking na
EXP. Daar staat een maand en een jaar.
De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.

6. Inhoud van de verpakking en
overige informatie

Welke stoffen zitten er in
Echinaforcemed?

- De werkzame stof in dit middel is een
aftreksel van de Echinacea purpurea
plant en wortel (Rode Zonnehoeve).
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit
middel zijn: sucrose, gezuiverd water,
geconcentreerd vlierbessensap,
citroenzuur monohydraat,
gemodificeerd zetmeel,
middellange-keten triglyceriden,
kaliumsorbaat.

Hoe ziet Echinaforcemed eruit en wat
zit er in een verpakking?

Echinaforcemed is een donkerrode tot
donkerpaarse kleverige vloeistof met
een aromatische fruitige vlierachtige
geur en een aromatische, fruitige,
zoete, lichtjes zure smaak.

Dit geneesmiddel is verpakt in flesjes
van 100 ml.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder

A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
3560 Lummen
België
Tel.: +32 (0) 13 35 89 40
Fax.: +32 (0) 13 52 39 41
info@avogel.be

Fabrikant
A.Vogel BV
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Nederland
Tel.: +31 (0) 525 687200
Fax.: +31 (0) 525 683932
registratie@avogel.nl

Registratienummer
BE-TU661454

Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Neem voor alle informatie met betrekking
tot dit geneesmiddel contact op met uw
arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
03/2024.

Notice : information
de l'utilisateur

Echinaforcemed
solution à diluer
pour solution
buvable

Echinacea purpurea

Veuillez lire attentivement
cette notice avant d'utiliser ce
médicament car elle contient des
informations importantes pour
vous.

Vous devez toujours utiliser
ce médicament en suivant
scrupuleusement les informations
fournies dans cette notice ou par
votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez
avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien
pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez fortement un des
effets indésirables mentionnés à la
rubrique 4, parlez-en à votre médecin
ou votre pharmacien. Ceci s'applique
aussi à tout effet indésirable qui
ne serait pas mentionné dans cette
notice.
- Vous devez vous adresser à votre
médecin si vous ne ressentez aucune
amélioration ou si vous vous sentez
moins bien après 10 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Echinaforcemed solution
à diluer pour solution buvable, et
dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations
à connaître avant d'utiliser
Echinaforcemed solution à diluer pour
solution buvable
3. Comment utiliser Echinaforcemed
solution à diluer pour solution
buvable
4. Quels sont les effets indésirables
éventuels ?
5. Comment conserver Echinaforcemed
solution à diluer pour solution
buvable
6. Contenu de l'emballage et autres
informations

1. Qu'est-ce qu'Echinaforcemed
solution à diluer pour solution
buvable, et dans quel cas est-il
utilisé

Echinaforcemed est un médicament
traditionnel à base de plantes, destiné à
soulager les symptômes du rhume.

Ce produit est un médicament
traditionnel à base de plantes à utiliser
selon l'indication spécifiée uniquement
sur la base d'une utilisation à long
terme.

Echinaforcemed est indiqué chez les
adultes et les adolescents de plus de
12 ans.

Vous devez vous adresser à votre
médecin si vous ne ressentez aucune
amélioration ou si vous vous sentez
moins bien après 10 jours.

2. Quelles sont les informations
à connaître avant d'utiliser
Echinaforcemed solution à diluer
pour solution buvable

N'utilisez jamais Echinaforcemed :

- Si vous êtes allergique à l'un des
composants contenus dans ce
médicament, mentionnés dans la
rubrique 6.
- Si vous êtes allergique à Echinacea
purpurea ou à d'autres plantes de la
famille des Asteraceae (Composées).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin
ou pharmacien avant d'utiliser
Echinaforcemed.

- Si vous souffrez de certaines maladies
systémiques évolutives (maladie
chronique touchant plusieurs organes
ou le corps entier, qui s'aggrave de
plus en plus), de certaines maladies
auto-immunes (maladie dans
laquelle l'organisme considère ses
propres cellules comme étrangères),
d'immunodéficience (votre
système immunitaire ne
fonctionne pas ou pas correctement),
d'immunosuppression (inhibition des
défenses naturelles contre les propres
substances de l'organisme) ou de
certaines maladies du système des
globules blancs.
- Si les symptômes s'aggravent
ou si vous développez une fièvre
élevée pendant le traitement par
Echinaforcemed, vous devez consulter
un médecin.
- Si vous avez une prédisposition
héréditaire à une allergie, vous devez
consulter votre médecin avant de
commencer à utiliser Echinaforcemed.

Echinaforcemed est un médicament
traditionnel à base de plantes, destiné à
soulager les symptômes du rhume.

Ce produit est un médicament
traditionnel à base de plantes à utiliser
selon l'indication spécifiée uniquement
sur la base d'une utilisation à long
terme.

Echinaforcemed est indiqué chez les
adultes et les adolescents de plus de
12 ans.

Vous devez vous adresser à votre
médecin si vous ne ressentez aucune
amélioration ou si vous vous sentez
moins bien après 10 jours.

2. Quelles sont les informations
à connaître avant d'utiliser
Echinaforcemed solution à diluer
pour solution buvable

Informez votre médecin ou votre
pharmacien si vous utilisez, avez
récemment utilisé ou pourriez
utiliser tout autre médicament
qu'Echinaforcemed.

Aucune interaction avec d'autres
médicaments n'a été rapportée.

Echinaforcemed avec des aliments et des
boissons

Echinaforcemed peut être utilisé en
association avec des aliments et des
boissons.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,
si vous pensez être enceinte ou planifiez
une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce
médicament.

L'utilisation pendant la grossesse et
l'allaitement n'est pas recommandée.

Conduite de véhicules et utilisation de
machines

Les effets du médicament sur l'aptitude
à conduire des véhicules et à utiliser des
machines n'ont pas été étudiés.

Echinaforcemed contient du sucre

Si votre médecin vous a informé(e) que
vous avez une intolérance à certains
sucres, contactez votre médecin avant de
prendre ce médicament.

Contient 4,121 g de saccharose par 5 ml.
Ceci est à prendre en compte pour les
patients atteints de
diabète sucré.

3. Comment utiliser Echinaforcemed
solution à diluer pour solution buvable

Veillez à toujours utiliser ce médicament
en suivant exactement les instructions
de cette notice ou les indications de
votre médecin ou pharmacien. En cas de
doute, consultez votre médecin ou votre
pharmacien.

La dose recommandée est de :

- Enfants de plus de 12 ans, adultes et
personnes âgées :
- Jour 1 à 3 : Prendre 5 ml 5 fois par jour.
- Jour 4 à 10 : Prendre 5 ml 3 fois par jour.

Utilisation chez les enfants

L'utilisation chez l'enfant de moins de 1
2 ans n'est pas recommandée.

Exclusivement par voie orale. Ne pas
dépasser la dose recommandée.
Secouer avant emploi.
Echinaforcemed doit être dissous dans
150 ml d'eau chaude. Mélanger avant de
boire.

Commencer le traitement dès les premiers
symptômes.
Si les symptômes persistent pendant plus
de 10 jours, contactez votre médecin ou
votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus d'Echinaforcemed
que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop d'Echinaforcemed,
prenez immédiatement contact avec votre
médecin, votre pharmacien ou le Centre
Antipoisons (070/245.245).

Si vous avez utilisé plus que la dose
recommandée, aucun effet indésirable n'est
généralement attendu.

Si vous oubliez d'utiliser Echinaforcemed

Ne prenez pas de dose double pour
compenser la dose que vous avez oublié de
prendre et prenez la dose suivante à l'heure
habituelle.

Si vous arrêtez d'utiliser Echinaforcemed

Aucun effet n'est attendu si vous arrêtez
d'utiliser ce médicament.

Si vous avez d'autres questions sur
l'utilisation de ce médicament, demandez
plus d'informations à votre médecin ou à
votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables
éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce
médicament peut provoquer des effets
indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

Peau

Réactions d'hypersensibilité telles qu'une
éruption cutanée, une urticaire, des
démangeaisons et un gonflement du
visage.
Angioedème cutané (accumulation
soudaine de liquide dans la peau et les
muqueuses, par exemple dans la gorge
ou la langue, difficultés respiratoires et/
ou démangeaisons et éruption cutanée).

Réactions allergiques
Réactions allergiques au niveau des
poumons, bronchospasmes avec
obstruction, asthme.
Syndrome de Stevens-Johnson (réaction
allergique sévère avec fièvre élevée,
cloques sur la peau, douleurs articulaires
et/ou inflammation oculaire).

Choc anaphylactique (réaction allergique
sévère à certaines substances,
entraînant une forte baisse de la
pression artérielle, une pâleur, une
agitation, un pouls rapide et faible,
une peau moite et une diminution
de la conscience à la suite d'une
vasodilatation soudaine et forte).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet
indésirable, parlez-en à votre médecin
ou votre pharmacien. Ceci s'applique
aussi à tout effet indésirable qui ne
serait pas mentionné dans cette notice.

Comment se présente Echinaforcemed
et contenu de l'emballage extérieur

Echinaforcemed est un liquide visqueux
de couleur rouge foncé à violet foncé, à
l'odeur aromatique fruitée évoquant le
sureau et au goût aromatique fruité, sucré
et légèrement acide.

Agence Fédérale des Médicaments et
des Produits de Santé
www.afmps.be
Division Vigilance
Site internet : www.
notifieruneffetindesirable.be
E-mail : adr@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables,
vous contribuez à fournir davantage
d'informations sur la sécurité du
médicament.

Gebrauchsinformation:
Information für Anwender

Echinaforcemed
Konzentrat zur
Herstellung einer
Lösung zum
Einnehmen

Echinacea purpurea

Lesen Sie die gesamte
Packungsbeilage sorgfältig durch,
bevor Sie mit der Einnahme dieses
Arzneimittels beginnen, denn sie
enthält wichtige Informationen
für Sie.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel
immer genau nach Absprache mit
Ihrem Arzt oder Apotheker ein.
• Heben Sie diese Packungsbeilage auf.
Vielleicht möchten Sie diese später
nochmals lesen.

- Wenn Sie weitere Fragen haben,
wenden Sie sich an Ihren Apotheker.
- Wenn Sie Nebenwirkungen
bemerken, wenden Sie sich an Ihren
Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für
Nebenwirkungen, die nicht in dieser
Packungsbeilage angegeben sind.
Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Beschwerden nach
10 Tagen verschlimmern oder keine
Besserung eintritt, müssen Sie auf
jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Echinaforcemed Konzentrat
zur Herstellung einer Lösung zum
Einnehmen und wofür wird es
angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme
von Echinaforcemed Konzentrat
zur Herstellung einer Lösung zum
Einnehmen beachten?
3. Wie ist Echinaforcemed Konzentrat
zur Herstellung einer Lösung zum
Einnehmen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Echinaforcemed Konzentrat
zur Herstellung einer Lösung zum
Einnehmen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere
Informationen

1. Was ist Echinaforcemed Konzentrat
zur Herstellung einer Lösung zum
Einnehmen und wofür wird es
angewendet ?

Echinaforcemed ist ein traditionelles
pflanzliches Arzneimittel zur Linderung der
Symptome einer Erkältung.

Die Einnahme dieses traditionellen
pflanzlichen Arzneimittels im genannten
Anwendungsgebiet beruht ausschließlich
auf langjähriger Verwendung.

Echinaforcemed ist bei Erwachsenen und
Jugendlichen über 12 Jahre angezeigt.

Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser
oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich
an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme
von Echinaforcemed Konzentrat
zur Herstellung einer Lösung zum
Einnehmen beachten?

Echinaforcemed darf nicht eingenommen
werden,
• Wenn Sie allergisch gegen einen der
in diesem Arzneimittel enthaltenen

77000784 / AN20240409