

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Echinaforcedmed anwenden.

- Wenn Sie an bestimmten progressiven systemischen Erkrankungen leiden (chronische Erkrankung einiger Organe oder des gesamten Körpers, die immer schwerer wird), Autoimmunerkrankungen (Krankheit, bei der der Körper die körpereigenen Zellen als fremd betrachtet), Immundefekten (ein nicht oder nicht funktionierendes Immunsystem), Immunsuppression (Unterdrückung der natürlichen Abwehrreaktionen gegen körpereigene Substanzen) und Erkrankungen der weißen Blutkörperchen.
- Bei Verschlimmerung der Symptome oder hohem Fieber während der Einnahme von Echinaforcedmed ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.
- Wenn Sie eine genetische Veranlagung für eine Allergie haben, sollten Sie vor der Einnahme von Echinaforcedmed Ihren Arzt konsultieren.

Kinder

Die Einnahme durch Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Einnahme von Echinaforcedmed zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Es liegen keine Berichte über Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln vor.

Einnahme von Echinaforcedmed zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Echinaforcedmed kann zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken angewendet werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder

wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Einnahme während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Echinaforcedmed enthält Lactose
Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Echinaforcedmed enthält Soja-Polysaccharide
Es darf nicht eingenommen/angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Erdnuss oder Soja sind.

3. Wie ist Echinaforcedmed Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:
Kinder über 12 Jahre, Erwachsene und ältere Menschen:
• 2-3x pro Tag 1 Tablette einnehmen.

Anwendung bei Kindern

Die Einnahme durch Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Nur zum Einnehmen. Nehmen Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis ein.

Vor der Mahlzeit mit etwas Wasser einnehmen.

Wenn die Symptome länger als 10 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge von Echinaforcedmed eingenommen haben, als Sie sollten

Falls Sie mehr Echinaforcedmed eingenommen haben, als Sie sollten, nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder der Notgiftzentrale (070/245.245) auf.

Wenn Sie die Einnahme von Echinaforcedmed vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, und nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit ein.

Wenn Sie die Einnahme von Echinaforcedmed abbrechen
Es sind keine Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Einnahme dieses Arzneimittels abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Haut
Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, Nesselsucht, Juckreiz, Anschwellen des Gesichts. Angioödem der Haut (plötzliche Ansammlung von Flüssigkeit in der Haut und Schleimhäuten, z. B. im Hals oder in der Zunge, kann zu Engegefühl und/oder Schwellungen führen).

Allergische Reaktionen

Allergische Reaktionen in Höhe der Lunge, Bronchospasmen mit Obstruktion, Asthma. Stevens-Johnson-Syndrom (schwere allergische Reaktion mit hohem Fieber, Blasenbildung auf der Haut, Gelenkschmerzen und/oder Augenentzündung). Anaphylaktischer Schock (schwere allergische Reaktion auf bestimmte Substanzen, bei denen starker Blutdruckabfall, Blässe, Unruhe, schwacher schneller Puls, kalte und feuchte Haut und Bewusstseinsstörung infolge einer plötzlichen, starken Gefäßerweiterung auftreten).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderale Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
www.afmps.be
Abteilung Vigilanz
Website: www.notifierunefetindesirable.be
E-Mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Echinaforcedmed Tabletten aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Nach dem Öffnen der Packung innerhalb von 7 Monaten aufbrauchen.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach <EXP> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Echinaforcedmed enthält
• Der Wirkstoff ist ein Extrakt aus der Pflanze und der Wurzel von Echinacea purpurea (Purpur-Sonnenhut).
• Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose, Stärke, Soja-Polysaccharide und Magnesiumstearat.

Wie Echinaforcedmed aussieht und Inhalt der Packung

Echinaforcedmed sind runde, bikonvexe Tabletten mit einem abgeschrägten Rand und einem aromatischen Duft sowie einem aromatischen, süßen und betäubenden Geschmack.


Dieses Arzneimittel ist in Flaschen mit 30 Tabletten verpackt.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Registrierungsinhaber und Hersteller

Registrierungsinhaber
A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 Bus 7
3560 Lummen
Belgien
Tel.: +32 (0) 13 35 89 40
Fax: +32 (0) 13 52 39 41
info@avogel.be

Hersteller
A.Vogel BV
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Niederlande
Tel.: +31 (0) 525 687200
Fax: +31 (0) 525 683932
registratie@avogel.nl



Zulassungsnummer
BE-TU661456

Art der Abgabe
Apothekenpflichtig.

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker in Verbindung.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 03/2024.



Fold

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Echinaforcedmed tabletten

Echinacea purpurea

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of apotheker u dat heeft verteld.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
• Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker.
• Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Echinaforcedmed tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Echinaforcedmed tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Echinaforcedmed tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Echinaforcedmed tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Echinaforcedmed tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Echinaforcedmed tabletten is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor de verlichting van symptomen van een verkoudheid.

Dit product is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor gebruik bij de gespecificeerde indicatie uitsluitend gebaseerd op langdurig gebruik.

Echinaforcedmed is geïndiceerd voor volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar.

Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder of wordt deze zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u Echinaforcedmed tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Echinaforcedmed niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

- U bent allergisch voor Echinacea purpurea of voor andere planten van de Asteraceae (Composieten) familie.
- U bent allergisch voor pinda's of soja.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Echinaforcedmed?

Neem contact op met uw arts, apotheker voordat u dit middel gebruikt.
• Indien u lijdt aan bepaalde progressieve systemische aandoeningen (chronische aandoening van een aantal organen of het gehele lichaam die steeds ernstiger wordt), auto-immuunziekten (ziekte waarbij het lichaam de lichaamseigen cellen als lichaamsvreemd aanziet), immunodeficiënties (een niet of niet goed werkend afweersysteem), immunosuppressie (het onderdrukken van de natuurlijke afweerreacties tegen lichaamseigen stoffen) en ziekten van het witte bloedcel systeem.
• Als de verschijnselen verergeren of hoge koorts optreedt tijdens het gebruik van Echinaforcedmed dient een arts te worden geraadpleegd.
• Indien u een erfelijke aanleg heeft voor het verkrijgen van een allergie moet u uw arts raadplegen vooraleer u Echinaforcedmed begint te gebruiken.

Kinderen
Het gebruik bij kinderen onder 12 jaar wordt niet aanbevolen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Echinaforcedmed nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen meldingen van wisselwerkingen met andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Echinaforcedmed kan in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding wordt niet aanbevolen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het middel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Echinaforcedmed bevat lactose

Indien uw arts u heeft megedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Echinaforcedmed bevat sojapolysacchariden

Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor pinda's of soja.

3. Hoe gebruikt u Echinaforcedmed tabletten?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Kinderen ouder dan 12 jaar, volwassenen en ouderen:
• 2-3x per dag 1 tablet.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik bij kinderen onder 12 jaar wordt niet aanbevolen.

Enkel voor inname via de mond. Niet meer dan de aanbevolen dosering gebruiken. Voor de maaltijd met wat water innemen.

Indien de symptomen langer dan 10 dagen aanhouden, neem contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van Echinaforcedmed gebruikt?

Wanneer u te veel van Echinaforcedmed heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Echinaforcedmed te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen en neem de volgende dosis op het gewone tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van Echinaforcedmed

Er zijn geen effecten te verwachten als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Huid

Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, netelroos, jeuk, opzwellen van het gelaat. Angio-oedeem van de huid (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, bijv. in keel of tong, kan leiden tot benauwdheid en/of zwelling).

Allergische reacties

Allergische reacties ter hoogte van de longen, bronchospasmen met obstructie, astma. Stevens-Johnson-syndroom (ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking). Anafylactische shock (ernstige allergische

reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge, sterke vaatverwijding).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
www.fagg.be
Afdeling Vigilantie
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
E-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Echinaforcedmed tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Gebruiken binnen de 7 maanden na openen van de verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Echinaforcemed?

- De werkzame stof in dit middel is een extract van de Echinacea purpurea plant en wortel (Rode Zonnehoeed).
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: lactose, zetmeel, soja polysacchariden en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Echinaforcemed eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Echinaforcemed zijn ronde, biconvexe tabletten met een schuine rand met een aromatische geur en een aromatische, zoete en verdovende smaak.

Dit geneesmiddel is verpakt in flessen met 30 tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder
A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
3560 Lummen
België
Tel.: +32 (0) 13 35 89 40
Fax.: +32 (0) 13 52 39 41
info@avogel.be

Fabrikant
A.Vogel BV
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Nederland
Tel.: +31 (0) 525 687200
Fax.: +31 (0) 525 683932
registratie@avogel.nl

Registratienummer
BE-TU661456

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2024.

Notice : information de l'utilisateur

Echinaforcemed comprimés

Echinacea purpurea

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez fortement un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Echinaforcemed comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Echinaforcemed comprimés ?
3. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Echinaforcemed comprimés ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Echinaforcemed comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?

Echinaforcemed comprimés, est un médicament traditionnel à base de plantes, destiné à soulager les symptômes du rhume.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes à utiliser selon l'indication spécifiée uniquement sur la base d'une utilisation à long terme.

Echinaforcemed est indiqué chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Echinaforcemed comprimés ?

N'utilisez jamais Echinaforcemed :

- Si vous êtes allergique à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique à l'Echinacea purpurea ou à d'autres plantes de la famille des Asteraceae (Composées).
- Si vous êtes allergique aux arachides ou au soja.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

- Si vous souffrez de certaines maladies systémiques évolutives (maladie chronique touchant plusieurs organes ou le corps entier, qui s'aggrave de plus en plus), de certaines maladies auto-immunes (maladie dans laquelle l'organisme considère ses propres cellules comme étrangères), d'immunodéficience (votre système immunitaire ne fonctionne pas ou pas correctement), d'immunosuppression (inhibition des défenses naturelles contre les propres substances de l'organisme) ou de certaines maladies du système des globules blancs.
- Si les symptômes s'aggravent ou si vous développez une fièvre élevée pendant l'utilisation d'Echinaforcemed, vous devez consulter un médecin.
- Si vous avez une prédisposition héréditaire à une allergie, vous devez consulter votre médecin avant de commencer à utiliser Echinaforcemed.

Enfants

L'utilisation chez l'enfant de moins de 12 ans n'est pas recommandée.

Autres médicaments et Echinaforcemed comprimés

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament qu'Echinaforcemed comprimés.

Aucune interaction avec d'autres médicaments n'a été rapportée.

Echinaforcemed comprimés avec des aliments et des boissons

Echinaforcemed peut être utilisé en association avec des aliments et des boissons.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous

allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

L'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement n'est pas recommandée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les effets du médicament sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés.

Echinaforcemed contient du lactose

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Echinaforcemed contient des polysaccharides de soja

Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, ne pas utiliser ce médicament.

3. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de :

Enfants de plus de 12 ans, adultes et personnes âgées :
• 2-3x par jour 1 comprimé.

Utilisation chez les enfants

L'utilisation chez l'enfant de moins de 12 ans n'est pas recommandée.

Exclusivement par voie orale. Ne pas dépasser la dose recommandée.

Prendre avant le repas, avec un peu d'eau.

Si les symptômes persistent pendant plus de 10 jours, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus d'Echinaforcemed que vous n'auriez dû
Si vous avez utilisé trop d'Echinaforcemed, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Echinaforcemed

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre et prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

Si vous arrêtez d'utiliser Echinaforcemed
Aucun effet n'est attendu si vous arrêtez d'utiliser ce médicament.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Peau

Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.
Angioedème cutané (accumulation soudaine de liquide dans la peau et les muqueuses, par exemple dans la gorge ou la langue, pouvant entraîner une oppression et/ou un gonflement).

Réactions allergiques

Réactions allergiques au niveau des poumons, bronchospasmes avec obstruction, asthme.
Syndrome de Stevens-Johnson (réaction allergique sévère avec fièvre élevée, cloques sur la peau, douleurs articulaires et/ou inflammation oculaire).
Choc anaphylactique (réaction allergique

sévère à certaines substances, entraînant une forte baisse de la pression artérielle, une pâleur, une agitation, un pouls rapide et faible, une peau moite et une diminution de la conscience à la suite d'une vasodilatation soudaine et forte).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
www.afmps.be
Division Vigilance
Site internet :
www.notifieruneffetindesirable.be
E-mail : adr@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Echinaforcemed comprimés ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Utiliser dans les 7 mois suivant l'ouverture de l'emballage.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage, après EXP. Un mois et une année sont indiqués. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Echinaforcemed

- La substance active est un extrait de la plante et de la racine d'Echinacea purpurea (échinacée pourpre).
- Les autres composants (excipients) sont le lactose, l'amidon, les polysaccharides de soja et le stéarate de magnésium.

Comment se présente Echinaforcemed et contenu de l'emballage extérieur

Echinaforcemed se présente sous forme de comprimés ronds, biconvexes, à bord biseauté, à l'odeur aromatique et au goût aromatique, sucré et anesthésiant.

Ce médicament est conditionné en flacons contenant 30 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

A.Vogel S.A.
Bosstraat 54 bus 7
3560 Lummen
Belgique
Tél. : +32 (0) 13 35 89 40
Fax : +32 (0) 13 52 39 41
info@avogel.be

Fabricant

A.Vogel BV
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 525 687200
Fax : +31 (0) 525 683932
registratie@avogel.nl

Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché

BE-TU661456

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Echinaforcemed Tabletten

Echinacea purpurea

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein.
- Heben Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Apotheker.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Beschwerden nach 10 Tagen verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Echinaforcemed Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahmeveron Echinaforcemed Tabletten beachten?
3. Wie sind EchinaforcemedTabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind EchinaforcemedTabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Echinaforcemed Tabletten und wofür wird es angewendet?

Echinaforcemed Tabletten ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung der Symptome einer Erkältung.

Die Einnahme dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Echinaforcemed ist bei Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahre angezeigt.

Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinaforcemed Tabletten beachten?

Echinaforcemed darf nicht eingenommen werden,
• Wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
• Wenn Sie allergisch gegen Echinacea purpurea oder andere Pflanzen der Asteraceae-Familie (Korbblütler) sind
• Wenn Sie allergisch gegen Erdnüsse oder Soja sind.